

Дезинфекционные мероприятия при брюшном тифе, паратифах, сальмонелезах и ОКИ

№	Объекты, подлежащие дезинфекции	Заключительной дезинфекции	Текущей дезинфекции и карантину	Примечание
1	Выделения (моча, фекалии, рвотные массы)	Засыпают сухой хлорной известью белильной термостойкой из расчета 200 г/кг или двутреть основной солью гипохлорита кальция (ДТС ГК) 100 г/кг / НГК/на 60 мин. нейтральным гипохлоритом кальция /НГК/-150 г/кг на 120 мин.	Так же, как при заключительной дезинфекции.	При необходимости к оформленным фекалиям добавляют воду в соотношении 1:4. При карантине выделения контактных обеззараживают.
	Моча	Добавляют сухую хлорную известь или известь белильную термостойкую из расчета 10 г. на литр или ДТСГК или НГК-5 г/л, перемешивают и оставляют на 5 мин. после чего сливают в канализацию, уборную.	-//-	
2	Посуда из-под выделений (ночные горшки, подкладные судна, моче-приемники и др. квачи).	Погружают в один из дезинфицирующих растворов 1% раствор хлорамина на 60 мин. 1% раствор хлорной извести или извести белильной термостойкой на 60 мин. или 0,5% осветленный р-р ДТСГК или НГК на 60 мин.	-//-	После обеззараживания тщательно промывают водой.
3	Посуда больного /чайная, столовая/, освобожденная от остатков пищи.	Кипятят в 2% р-ре питьевой воды в течение 15 мин. От момента закипания или погружают в один из Дезинфицирующих растворов на 60 мин. 1% р-р хлорамина, 1% раствор хлорной извести или извести белильной, термостойкой, 0,5% осветленный р-р ДТС ГК или НГК, или в 3% р-р перекиси водорода с 0,5% моющего средства.	-//-	После тщательно промывают проточной водой.
4	Ветошь, мочалки, для мытья посуды, поверхностей обеденных столов	Кипятят в 2% р-ре питьевой воды в течение 15 мин. От момента закипания, или погружают в один из дезинфицирующих р-ров на 60 мин., 1% р-р хлорамина, 1% р-р хлорной извести или извести белильной термостойкой, 0,5% р-р ДТС ГК или НГК.	Так же, как при заключительной дезинфекции.	После обеззараживания тщательно промывают водой.

№	Объекты, подлежащие дезинфекции	Заключительной дезинфекции	Текущей дезинфекции и карантину	Примечание
5	Остатки пищи	Кипятят 15 мин. От момента закипания или засыпают сухой хлорной известью, или известью белильной термостойкой из расчета 200 г/кг, ДТСГК или НГК-100 г/кг перемешивают и оставляют на 60 мин., на 240 мин.	-//-	При необходимости к густым и плотным остаткам пищи добавляют воду в соотношении 1:4.
6	Помещения, предметы обстановки, предметы ухода за больными, не допускающие кипячения (пузыри для льда, грелки, подкладные клеенки, клеенчатые чехлы матрацев).	Пол и стены на высоту 1,5 м. орошают из гидропульта одним из дезинфицирующих р-ров из расчета 300 мл/кв. м. или протирают ветошью, смоченной в одном из дезинфицирующих растворов 0,5% р-ром хлорамина, 0,5% осветленным р-ром хлорной извести или извести белильной термостойкой 0,25% осветленным р-ром ДТСГК или НГК, последующей уборкой помещения через 30 мин. при применении или обеззараживании 3% р-ра перекиси водорода с 0,5% моющего средства.	Ежедневно проводят влажную уборку помещений не менее 2 раз в день с использованием одного из дезинфицирующих р-ров, применяемых при заключительной дезинфекции, Норма расхода дезинфицирующих средств при протирании 200 мл/кв. м. поверхности. Предметы ухода за больным, клеенки и т. п. Обеззараживают протиранием ветошью, смоченной в указанных растворах и после экспозиции 60-30 мин. В случае загрязнения пола выделениями (фекалиями, рвотными массами) их тут же заливают одним из дезинфицирующих р-ров, 3% осветленным р-ром хлорной извести или извести белильной термостойкой, 3% р-ром хлорамина, 1% осветленным р-ром ДТСГК или НГК.	Осветленные р-ры хлорной извести, извести белильной термостойкой ДТСГК или НГК применяют только в отсутствие людей, в нежилых помещениях. Раствор метасиликата натрия для дезинфекции поверхностей, окрашенных масляной краской, не применяют. Полированную мебель протирают ветошью, увлажненной полиролем, глянцем, вазелиновым маслом и др. составом для чистки этой мебели.
7	Белье без следов загрязнения выделениями.	Кипятят в 2% р-ре соды или в р-ре любого порошка 15 мин. от момента закипания. При отсутствии возможности кипячения замачивают в 0,2% р-ре хлорамина или хлорной извести на 60 мин, 3% р-ре перекиси водорода с 0,5% моющего средства.	Так же как при заключительной дезинфекции.	После обеззараживания стирают и тщательно прополаскивают в воде.
8	Белье загрязненное выделениями.	Кипятят в 2% р-ре соды или в р-ре любого моющего средства, стирального порошка на 15 мин. От момента закипания или замачивают в одном из дезинфицирующих р-ров: в 1% р-ре хлорамина или хлорной извести на 120 мин. перекиси водорода с 0,5% моющего средства на 120 мин.	Так же как при заключительной дезинфекции.	После обеззараживания стирают и тщательно прополаскивают в воде.

№	Объекты, подлежащие дезинфекции	Заключительной дезинфекции	Текущей дезинфекции и карантину	Примечание
9	Игрушки (деревянные, пластмассовые, металлические)	Кипятят (кроме пластмассовых) в 2% содовом р-ре, или р-ре любого моющего средства 15 мин. от момента закипания, или обильно орошают из гидропульта, переворачивают их, или погружают в один из дезинфицирующих р-ров на 60 мин. в 0,5% р-ре хлорамина, 0,5% осветленный р-р хлорной извести белильной термостойкой, 0,25% осветленный р-р ДГСГК или НГК, в 3% р-р перекиси водорода с 0.5% моющего средства, или протирают ветошью, смоченной в одном из выше-названных р-ров дезинфицирующих средств.	Кипятят, как при текущей дезинфекции, протирают ветошью, смоченной в одном из указанных в п.9 дезинфицирующих р-ров.	После обеззараживания тщательно протирают проточной водой.
10	Постельные принадлежности (подушки, матрацы, одеяла), верхняя одежда, платье, ковры, нижнее белье, в котором больной прибыл в стационар.	Помещают в мешки, которые затем орошают одним из дезинфицирующих растворов, используемых для обеззараживания белья (п.7) и отправляют для дезинфекции в камерах по режимам, приведенным в табл.№8. При отсутствии возможности камерной дезинфекции чистят щетками, обильно смоченными одним из дезинфицирующих растворов, указанных в п.7.	Матрац закрывают подкладной клеенкой.	Если для обеззараживания применяли дезинфицирующие р-ры изделия сушат на открытом воздухе.
11	Тапочки больных	Обеззараживают в дезинфекционных камерах или в стационарах протирают тампоном, обильно смоченным в 25% раствором формалина или 40% р-ром уксусной кислоты, упаковывают в полиэтиленовый пакет и оставляют на 180 мин.		После обеззараживания растворами формалина или уксусной кислоты проветривают 10-12 час. до полного исчезновения запаха.
12	Сливные воды после мытья больного	Засыпают с последующим размешиванием одним из дезинфицирующих препаратов на 30 мин. Хлорной известью или известью белильной термостойкой из расчета 50 г/на 10 л. воды, ДТСГК или НГК 25 г. на 10 л. воды или добавляют дезинфицирующий р-р хлорной извести или извести белильной термостойкой, 5% р-р ДТС ГК или НГК из расчета 500 мл на 10 л. смывных вод.	Так же, как при заключительной дезинфекции.	
13	Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.)	Двукратно протирают ветошью, обильно смоченной в одном из дезинфицирующих р-ров, указанных в п.6, или орошают из гидропульта одним из этих растворов и пользуются указанным оборудованием только через 60 мин. Норма расхода дезраствора 500 мл. на кв. м.	Протирают ветошью, на которую наносят один из моющих-дезинфицирующих или чистящих-дезинфицирующих препаратов при норме расхода 0,5 г/100 кв.м. поверхности двукратно протирают ветошью, обильно смоченной в одном из дез. растворов, указанных в п.6.	После обеззараживания промывают водой.

№	Объекты, подлежащие дезинфекции	Заключительной дезинфекции	Текущей дезинфекции и карантину	Примечание
14	Надворные уборные, (отстойные ямы, мусорные ящики)	Орошают одним из дезинфицирующих растворов: 10% р-ром хлорной извести или извести белильной термостойкой, 5% р-ром ДТС ГК, или НГК.	Деревянные части надворных санитарно-технических установок ежедневно орошают изнутри одним из растворов как при заключительной дезинфекции.	
15	Мусор	Сжигают, при отсутствии возможности сжигания заливают одним из дезинфицирующих растворов: 10% р-ром хлорной извести или извести белильной термостойкой, 5% р-ром ДТС ГК или НГК и оставляют на 120 мин. 20% хлорно-известковым молоком — на 60 минут, раствора к массе мусора 2: 1.	Сжигают.	
16	Уборочный материал	Кипятят в 2% содовом, мыльном растворе или в растворе любого моющего средства 15 мин. от момента закипания или замачивают в одном из дезинфицирующих растворов: на 60 мин. в 1% р-ре хлорсодержащих препаратов.	Так же, как при заключительной дезинфекции.	После обеззараживания прополаскивают в воде и сушат.
17	Транспорт по перевозке больного	Орошают из гидропульта или двукратно протирают изнутри ветошью, смоченной в одном из дезинфицирующих растворов, указанных в п.6.		По окончании обеззараживания проводят влажную уборку.